

## 6. COMPLICATIONS ÉVENTUELLES

- Après le retrait du cathéter veineux, il se peut qu'un petit hématome sans danger apparaisse,
- Allergie non connue au produit de contraste iodé,
- Extravasation (diffusion accidentelle du produit de contraste dans les tissus mous autour de la zone où le cathéter veineux a été positionné) qui est un cas très rare et pourrait entraîner un traitement local.

## 7. QUESTIONS FRÉQUENTES

**L'examen est-il douloureux ?** La mise en place du cathéter veineux est similaire à la pique d'une prise de sang. Cependant, chacun réagit différemment à la douleur.

**Est-ce un problème si vous ne parvenez pas à boire tout le liquide prévu ?** Oui et non, plus les intestins sont distendus par le liquide, plus l'interprétation de l'examen est fiable. Si vous ne parvenez pas à tout boire, l'examen pourra quand-même être réalisé, mais les résultats seront peut-être moins parlants.

**Quels produits sont injectés dans la veine ?** Du produit de contraste iodé qui permet de mettre en évidence les vaisseaux et de rehausser les différentes structures internes de votre corps (foie, reins, rate,...) ainsi que du Buscopan®.

**Combien de temps dure l'examen ?** En comptant votre présence une heure avant votre rendez-vous, l'examen dure environ 1h15.

## IMAGERIE MÉDICALE

### OÙ NOUS TROUVER ?

Bâtiment **Médico-technique** : Rez-de-Chaussée

### CONTACTS

**085/27.27.31**

Ligne accessible toute la semaine de 8h à 17h.

**La prise de rendez-vous se fait par téléphone ou directement au guichet, du lundi au vendredi, de 8h à 17h.**

## INFORMATIONS

### **CHR DE HUY**

*L'HÔPITAL*

Rue des Trois Ponts 2

4500 Huy

085/27.21.11

### **EN LIGNE**

*SITE WEB*

[www.chrh.be](http://www.chrh.be)

*RÉSEAUX SOCIAUX*



Ref : 0570-258-0  
Edition : 03/06/2024

**BROCHURE À L'ATTENTION DU PATIENT**

# L'ENTÉRO-SCANNER

**chr** Huy

## 1. QU'EST-CE QU'UN SCANNER / UN ENTÉRO-SCANNER ?

Le **scanner** est une technique d'imagerie consistant à obtenir des images en 3D, sous forme de coupe, d'une région du corps. Il s'appuie sur un faisceau de rayons X dont l'absorption par les tissus est ensuite mesurée et traitée par ordinateur. Les images ainsi générées et "reconstruites" sont analysées par le médecin radiologue.

Durant l'examen, vous serez couché(e) sur une table pendant qu'un tube tournant autour de lui enregistre une succession d'images à 360°. Dans certains cas, suivant l'avis du médecin prescripteur et/ou du radiologue, l'injection d'un produit de contraste iodé par voie intraveineuse ou l'ingestion d'un produit opacifiant peuvent être nécessaires à la bonne réalisation de l'exploration par scanner.

L'**entéro-scanner** est un examen qui se réalise au scanner et qui a pour but de démontrer le mieux possible l'intestin grêle, c'est-à-dire la portion de l'intestin comprise entre l'estomac et le côlon. Pour bien visualiser l'intestin, il faut le déployer au maximum. Pour ce faire, vous serez invité(e) à boire une grande quantité de liquide qui va distendre vos intestins. Comme pour la plupart des scanners de l'abdomen, cet examen nécessite une injection de produit de contraste iodé.

## 2. COMMENT SE DÉROULE L'EXAMEN ?

Le technologue vous apportera 4 verres d'un liquide à boire (1 verre toutes les 10 minutes pendant 40 minutes). Il se peut que le produit vous provoque des diarrhées, vous trouverez des toilettes à l'accueil de la radio.

Une fois que vous aurez terminé de boire le produit, le technologue vous installera et vous placera un cathéter au niveau d'une veine dans le but d'injecter un produit de contraste iodé pendant l'examen.

Il sera aussi nécessaire d'injecter du Buscopan® avant de commencer l'examen pour relaxer et diminuer le mouvement des intestins sauf si vous présentez des contre-indications à ce médicament.

Il sera important de ne pas bouger durant toute la procédure d'acquisition des images et de respecter les consignes que la machine pourrait vous donner comme inspirer et bloquer votre respiration.

## 3. COMMENT VOUS PRÉPARER ?

Le jour de l'examen, vous devez vous présenter **une heure avant l'heure** de votre rendez-vous et être à jeun.

## 4. CONTRE-INDICATIONS

- Grossesse ;
- Allaitement ;
- Insuffisance rénale sévère ;
- Allergie au produit de contraste iodé ;
- Intolérance au Buscopan®.

## 5. SUIVI ET RECOMMANDATIONS

**Attention**, le liquide que vous allez boire, n'est pas résorbé par les intestins et sera donc éliminé entièrement par les selles.

Vous devez donc vous attendre à présenter une diarrhée liquide abondante (+/- 1 litre de liquide) dans les suites de l'examen. Il est donc vivement conseillé de passer aux toilettes avant de quitter l'hôpital et de ne pas vous éloigner des toilettes durant le reste de la journée.

Il vous sera également demandé de bien vous hydrater étant donné que vous avez reçu du produit de contraste, et d'arrêter pendant 48h un éventuel traitement pour le diabète (Metformine, Metformax, Glucophage).